

50歳以上の方への「带状疱疹予防接種」開始のお知らせ

50歳以上の方は带状疱疹を予防する带状疱疹ワクチンを接種することができます。带状疱疹の発症率は50歳代から急激に高くなりますので、まずは当院へお問い合わせ下さい。

带状疱疹の症状は？

带状疱疹は、水ぶくれを伴う赤い発疹が、体の左右どちらかに帯状に出ます。強い痛みを伴うことが多く、症状は3~4週間ほど続きます。多くは腕や胸、背中に症状が出ますが、顔や首などに現れることもあります。

なぜ带状疱疹になるの？

带状疱疹の原因は「水痘・带状疱疹ウイルス」です。日本の成人の9割以上が、すでにこのウイルスに感染したことがあり、体内にウイルスを持っています。そのため、ほとんどの人が带状疱疹になる可能性があります。

带状疱疹の発症率は、50歳代から急激に高くなります。带状疱疹患者の約7割が50歳以上です。また、日本では80歳までに、約3人に1人が带状疱疹になるといわれています。

带状疱疹は、体の免疫力が低下した時に発症します。免疫力の低下は、加齢、疲労、ストレスなど誰にでもごく日常的なことによって起こります。まだまだ元気だと思っても、ある日突然带状疱疹になるかもしれません。

带状疱疹を予防する方法は？

带状疱疹を予防するワクチンがあります。接種対象年齢は50歳以上です。費用は、7,000円です。

まずは当院にお問い合わせ下さい。

